

# Feel Free to touch

La seguridad está a una pasada



## ¿Por qué usar toallitas?



Eficacia virucida total **en solo 30 segundos** (coronavirus, norovirus, poliovirus, adenovirus y vaccinovirus)



Eficaces contra bacterias, virus y hongos



Fáciles de usar por **cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar**



El AHP es **más rápido, más seguro y más sostenible** que otros principios activos



**Rápidas de usar**, sin necesidad de preparaciones previas



Seguras para los usuarios, sin necesidad de EPIs



Protección **360°** para su personal, los visitas y las instalaciones



Mejoran la **eficiencia laboral** en un **23 %** frente al cubo y el trapo tradicionales\*



Un **35 %** más de **desinfección** demostrada\*



Evitan y previenen la **contaminación cruzada** en superficies



No inflamables



Compatibles con la mayoría de superficies de trabajo



Sin necesidad de tener que lavar bayetas



Eliminan los riesgos de derrames y salpicaduras

\* Resultados de un estudio publicado en el American Journal of Infection Control.

Utilice los biocidas con seguridad. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso.

## ¡PIÉNSELO!

Es necesario desinfectar toda superficie que se toque con frecuencia

[www.diverseym.com](http://www.diverseym.com)

Este material se proporciona únicamente como información general y no sustituye la responsabilidad del usuario de evaluar los requisitos operacionales, jurídicos o de otra índole aplicables a cada instalación. Todos los logotipos y marcas comerciales son propiedad de Diversey, Inc. o se utilizan bajo licencia. © 2021 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. 88006 MASTER 04/21

Diversey  
**Oxivir**<sup>TM</sup>  
powered by **AHP**<sup>®</sup>

# Feel Free to Touch

La seguridad está en una pasada

Centros Sociosanitarios

## Cuándo desinfectar



Antes/ Después de técnicas de asepsia (P. ej vendajes, CL, inserción de PICC, etc.)



antes de colocar una bandeja con comida



tras la asistencia con expectoración o vómitos




Cuando las superficies están visiblemente sucias



Después de bañar al paciente dentro de la cama o tras cualquier procedimiento en que haya heces, fluidos corporales o secreciones respiratorias

## Cómo desinfectar




Saque una toallita del dispensador y cierre el paquete o cubo con firmeza para evitar que las toallitas restantes se sequen.



Manteniendo la toallita estirada bajo la mano (sin estrujarla), limpie la superficie describiendo un movimiento en forma de "S", yendo de lo limpio a lo sucio. No repase la misma superficie dos veces con la misma toallita.



Deseche las toallitas usadas en el contenedor adecuado y de acuerdo a las instrucciones locales. No tire las toallitas por el inodoro.



Deje que la superficie se seque antes de utilizarla.

# ¡PIÉNSELO!

Es necesario desinfectar toda superficie que se toque con frecuencia

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

Este material se proporciona únicamente como información general y no sustituye la responsabilidad del usuario de evaluar los requisitos operacionales, jurídicos o de otra índole aplicables a cada instalación. Todos los logotipos y marcas comerciales son propiedad de Diversey, Inc. o se utilizan bajo licencia. © 2021 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. 88006 MASTER 04/21

Diversey

# Oxivir™

powered by **AHP**